

VĚKOVÁ MAPA AMINOKYSELINOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PKU

PRO DĚTI

PRO DOSPĚLÉ

(vhodné i pro ženy v přípravě na těhotenství, těhotné nebo v období kojení)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a více let

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVKY
V PLECHOVCE

Comida-PKU A
formula (400 g)
100 g prášku
= 11,8 g bílkovin*



Comida-PKU B (500 g)
100 g prášku = 73 g bílkovin*

NEUTRAL

Comida-PKU B formula (500 g)
100 g prášku = 31,1 g bílkovin*

NEUTRAL

Comida-PKU B formula (500 g)
100 g prášku = 31,1 g bílkovin*

JAHODA

ČOKOLÁDA

Comida-PKU C (500 g)
100 g prášku = 75,0 g bílkovin*

NEUTRAL

Comida-PKU C (500 g)
100 g prášku = 70,5 g bílkovin*

PIÑA COLADA

Comida-PKU C formula (500 g)
100 g prášku = 45,0 g bílkovin*

NEUTRAL

POMERANČ-CITRÓN



DÁVKOVANÉ PŘÍPRAVKY
V PRAŠKU



Comida-PKU B formula (20 x 32,2 g)
1 sáček = 10 g bílkovin*

JAHODA

ČOKOLÁDA

Comida-PKU B (30 x 14,3 g)
1 sáček = 10 g bílkovin*

PIÑA COLADA

Comida-PKU C (20 x 26,7 g)
1 sáček = 20 g bílkovin*

NEUTRAL

Comida-PKU C (20 x 28,6 g)
1 sáček = 20 g bílkovin*

PIÑA COLADA

Comida-PKU C formula (20 x 44,4 g)
1 sáček = 20 g bílkovin*

NEUTRAL

POMERANČ-CITRÓN



TEKUTÉ
PŘÍPRAVKY



Mevalia PKU Motion 20 (30 x 140 ml)
1 vak = 20 g bílkovin**

TROPICAL

RED FRUITS



* bílkovinný ekvivalent, neobsahuje fenylalanin (Phe)

** bílkovinný ekvivalent, může obsahovat stopové množství fenylalaninu (<5 mg/100ml)

Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii. Potravina pro zvláštní lékařské účely.



DrSchär
Innovating special nutrition.



NUTRIČNÍ INFORMACE (ve 100 g prášku/100 ml přípravku) AMINOKYSELINOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PKU



| | | Comida PKU A formula | Comida PKU B | Comida PKU B formula | Comida PKU B formula čokoláda | Comida PKU B formula jahoda | Comida PKU B Piña Colada | Mevalia PKU Motion Tropical 20 | Mevalia PKU Motion Red Fruits 20 | Comida PKU C | Comida PKU C Piña Colada | Comida PKU C formula | Comida PKU C formula pomeranč-citrón |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Věkové určení | | < 1 | 1-14 | 1-14 | 3-14 | 3-14 | 3-14 | ≥ 3 (i těhotné, v přípravě na těhotenství) | ≥ 3 (i těhotné, v přípravě na těhotenství) | ≥ 15 (i těhotné, v přípravě na těhotenství) | ≥ 15 (i těhotné, v přípravě na těhotenství) | ≥ 15 (i těhotné, v přípravě na těhotenství) | ≥ 15 (i těhotné, v přípravě na těhotenství) |
| Energie | kJ/ kcal | 2119/507 | 1257/296 | 1782/424 | 1745/415 | 1764/419 | 1260/296 | 328/77 | 337/79 | 1281/302 | 1249/294 | 1426/335 | 1408/331 |
| Bílkovinný ekvivalent | g | 11,8 | 73 | 31 | 31 | 31 | 70 | 14 | 14 | 75 | 71 | 45 | 45 |
| Aminokyseliny | g | 14,2 | 88 | 37 | 37 | 37 | 84 | 16,8 | 16,8 | 90 | 85 | 54 | 54 |
| Tuky | g | 27,4 | < 0,5 | 15 | 14 | 14,2 | < 0,5 | 0 | 0 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| nasyčené mastné kyseliny | g | 10,3 | < 0,1 | 6,3 | 6,1 | 6 | < 0,1 | - | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| mononenasyčené mastné kyseliny | g | 12,9 | - | 6,7 | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| polynenasycené mastné kyseliny | g | 4,2 | - | 2 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| kyselina linolová | g | 3,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| α-kyselina linolenová | g | 0,55 | - | 0,3 | 0,26 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| arachidinová kyselina | mg | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dokosaheptaenová kyselina | mg | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sacharidy | g | 52,7 | 0,5 | 41 | 39 | 41 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | < 0,5 | 4,3 | 39 | 36 |
| laktóza | g | 31,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
| maltodextrin | g | 14,9 | 0,5 | 38 | 35 | 36 | 3,3 | - | - | < 0,5 | 4 | 18 | 2,1 |
| sacharóza | g | - | < 0,5 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | < 0,5 | 3,3 | 4,9 | < 0,5 | < 0,5 | 21 | 32 |
| Velikost odměrky | g | 4,3 | 6,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 12 | 12 |
| obsah PE v 1 odměrce | g | 0,51 | 4,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Doporučené ředění - plechovky | | 13 g prášku + 90 ml vody | 12,4 g prášku + ~80 ml vody | 15-30 g prášku + 90 ml vody | 15-30 g prášku + 90 ml vody | 15-30 g prášku + 90 ml vody | - | - | - | 15 g prášku + 90 ml vody | 15 g prášku + 90 ml vody | 24 g prášku + ~110 ml vody | 24 g prášku + ~110 ml vody |
| Doporučené ředění - sáčky | | - | - | - | 1 sáček + 100-200 ml vody | 1 sáček + 100-200 ml vody | 1 sáček + 130 ml vody | - | - | - | 1 sáček + 170 ml vody | 1 sáček + 200-270 ml vody | 1 sáček + 200-270 ml vody |