


COMIDA PKU A FORMULA

je složena ze směsi aminokyselin bez fenylalaninu, sacharidů, speciální směsi tuků obsahující polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCP) a je doplněna o vitamíny, minerální látky a stopové prvky.



Důležitá upozornění:

- Není vhodný jako jediný zdroj výživy
- Používejte jen pod lékařským dohledem
- Není určené pro osoby bez PKU/HPA
- **Určené výhradně pro pacienty s PKU/HPA od narození do 1 roku**
- Není určené pro parenterální použití
- Není určené pro pacienty s laktózovou intolerancí

Doporučené dávkování: Doporučené množství **comida-PKU A formula** závisí na věku, tělesné hmotnosti a metabolickém stavu pacienta. Dávkování přípravku **comida-PKU A formula** musí lékař pravidelně sledovat a upravovat.

Použití: **Comida-PKU A formula** by měla být rozdělená do 3-5 dávek v průběhu dne, ideálně v kombinaci s mateřským mlékem nebo kojenecovou výživou ve spočítaném množství. Dieta musí obsahovat dostatečné množství energie, esenciálních mastných kyselin, fenylalaninu, aby byly zajištěny celkové nutriční potřeby pacienta.

Doporučené ředění výživy:

13 g **comida-PKU A formula** = 3 odměrky + 90 ml vody = 100 ml výživy

Objem výživy	Voda	Comida-PKU A formula	Bílkovinný ekvivalent	
ml	ml	g	= odměrky	g
35	30	4,3	1	0,51
100	90	13	3	1,5
200	180	26	6	3,1

Příprava (standardní ředění): Nalijte požadovaný objem horké dříve převařené vody (ochlazené na 50 °C) do dětské láhve. Přidejte odměřené množství **comida-PKU A formula** a, je-li to vhodné, standardní kojenecovou výživu, uzavřete láhev a dobře protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. Před krmením se ujistěte, že má kojenecová výživa správnou teplotu umístěním několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. Výživu připravujte vždy čerstvou a nespotřebované množství zlikvidujte. Je potřebné kontrolovat hygienu ústní dutiny počínaje prvními zuby dítěte, především před spaním.

Skladování: Balené v ochranné atmosféře. Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití pečlivě uzavřete plechovku, nutno spotřebovat do 4 týdnů od prvního otevření.

Obsah: 400 g
Celkový obsah se může lišit z technických důvodů..

Složení: Laktóza (mléko), rostlinný olej (palmový olej, slunečnicový, řepkový olej), antioxidanty: extrakty bohaté na tokoferol (E 306), ascorbyl palmitát; emulgátor: slunečnicový lecitin (E 322), maltodextrin, škrob, L-lysin-L-glutamat, L-arginin-L-aspartát, L-leucin, L-tyrosin, hydrogenfosforečnan vápenatý, emulgátor: mono a diglyceridy mastných kyselin, L-prolin, citran draselný, L-serin, L-isoleucin, L-treonin, L-valin, L-alanin, L-lysin-L-aspartát, glycin, L-glutamová kyselina, citran vápenatý, L-histidin, L-cystin, chlorid sodný, L-glutamin, cholin bitartrát, chlorid draselný, L-tryptofan, L-metionin, uhličitan hořečnatý, olej bohatý na DHA a EPA z mikrořas Schizochytrium sp., olej z Mortierella alpina, vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, nikotinamid, B6, kyselina listová, kyselina pantothenová, B12, biotin), inozitol, taurin, L-karnitin-L-tartrát, síran železnatý, síran zinečnatý, antioxidanty: askorbyl palmitát (E 304), síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, seleničitan sodný, chlorid chromitý, molybdenan sodný.

Nutriční informace v 100 g výrobku v 100 ml*

Energie kJ/kcal 2064/493 279/67

Tuky g 25 3,4

nasyčené mastné kyseliny g 10 1,4

mononenasycené mastné kyseliny g 9,6 1,3

polynenasycené mastné kyseliny g 5,5 0,7

kyselina linolová g 4,8 0,6

α -kyselina linolenová g 0,5 0,1

arachidinová kyselina mg 85 12

dokosahexaenová kyselina mg 100 13

Sacharidy g 54 7,3

z toho cukry g 34 4,6

laktóza g 33 4,4

Bílkoviny (ekvivalent)** g 12 1,6

Sůl g 0,38 0,05

Aminokyseliny g 14 1,9

L-alanin g 0,70 0,09

L-arginin g 0,76 0,10

L-Kyselina asparágová g 0,90 0,12

L-cystin g 0,38 0,05

L-glutamová kyselina g 1,36 0,18

L-glutamin g 0,34 0,05

Glycin g 0,66 0,09

L-histidin g 0,41 0,06

L-isoleucin g 0,81 0,11

L-leucin g 1,33 0,18

L-lysin g 1,15 0,16

L-metionin g 0,28 0,04

L-prolin g 1,13 0,15

L-serin g 0,88 0,12

L-treonin g 0,79 0,11

L-tryptofán g 0,29 0,04

L-tyrosin g 1,25 0,17

L-valin g 0,79 0,11

Minerální látky

Sodík mg 151 20

Draslík mg 472 63,7

Chloridy mg 377 50,9

Vápník mg 464 62,6

Fosfor mg 280 37,8

Hořčík mg 69,6 9,39

Železo mg 6,0 0,8

Stopové prvky

Zinek mg 4,6 0,6

Měď μ g 341 46

Jód μ g 90 12,2

Chrómov μ g 9,3 1,3

Mangan μ g 232 31

Molybden μ g 12 1,6

Selen μ g 24 3,2

Vitamíny

Vitamin A (RE) μ g 555 74,9

Vitamin D3 μ g 10 1,4

Vitamin E (α -tokoferol) mg 8,6 1,2

Vitamin K1 μ g 23 3,1

Vitamin C mg 88 12

Vitamin B1 μ g 444 60

Vitamin B2 μ g 888 120

Niacin NE mg 4,5 0,61

Vitamin B6 μ g 555 75

Folát (DFE) μ g 139 18,8

Kyselina pantothenová mg 3,9 0,52

Vitamin B12 μ g 1,1 0,15

Biotin μ g 11 1,5

L-karnitin mg 26 3,5

Cholin mg 124 17

Inositol mg 100 13

Taurin mg 35 4,7

* 13,5 g v 90 ml vody

** Přepočít:

1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny = 17 kJ = 4 kcal

Číslo šarže / Minimální trvanlivost do:
viz dno plechovky

Kontakt: IEM Allergy s.r.o., Padovská 696, 109 00 Praha 10, e-mail: info@iemallergy.com, www.iemallergy.com

Vyrobeno pro: Dr. Schär AG, Winkellau 9, 39014 Burgstall / Postal, Itálie

Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii.

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

