


COMIDA PKU C

je směs čistých L-aminokyselin bez fenylalaninu
a je doplněna o vitamíny, minerální látky
a stopové prvky podle současných doporučení.



Důležitá upozornění:

- Není vhodný jako jediný zdroj výživy
- Používejte jen pod lékařským dohledem
- Není určené pro osoby bez PKU/HPA
- Určené výhradně pro pacienty s PKU/HPA ve věku od 15 let, dospělě, ženy plánující otěhotnění a těhotné
- Není určené pro parenterální použití

Doporučené dávkování: Doporučené množství **comida-PKU C** závisí na věku, tělesné hmotnosti a metabolickém stavu pacienta. Dávkování přípravku **comida-PKU C** musí lékař pravidelně sledovat a upravovat.

Použití: **Comida-PKU C** by měla být rozdělena do 3-5 dávek v průběhu dne, ideálně v kombinaci s vypočteným množstvím jiných potravin (např. nápojů, ovocných přípravků). Dieta musí obsahovat dostatečné množství energie, esenciálních mastných kyselin, fenylalaninu, aby byly zajištěné celkové nutriční potřeby pacienta.

Doporučené ředění:
1 sáček (26,7 g) v cca 170 ml vody



Příprava (standardní ředění): Obsah sáčku rozmíchejte v 170 ml studené vody a dobře promíchejte. Výživu připravujte vždy čerstvou a nepotřebované množství zlikvidujte. Je potřebné kontrolovat hygienu ústní dutiny, především před spaním.

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě.

Obsah: 534 g – 20 sáčků (26,7 g),
1 sáček (26,7 g) obsahuje 20 g bílkovinného ekvivalentu
Celkový obsah se může lišit z technických důvodů.

Složení: L-lysin-L-glutamát, L-tyrosin, L-leucin, L-prolin, glutamát draselný, L-arginin-L-aspartát, L-serin, aspartát hořečnatý, L-lysin-L-aspartát, L-valin, L-isoleucin, treonin, L-glutamin, L-alanin, fosforečnan vápenatý, glycin, L-cystin, L-histidin, L-tryptofan, metionin, hydrogenfosforečnan vápenatý, kyselina L-glutamová, vitamíny (A, D, E, K, C, B1, B2, nikotinamid, B6, kyselina listová, kyselina pantotenová, B12, biotin), inositol, vanilin, L-karnitin-L-tartrát, síran železitý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, jodid draselný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, molybdenan sodný.

Nutriční informace	v 100 g výrobku	v 1 sáčku
Energie	kJ/kcal	1281/302 342/81
Tuky	g	< 0,5 < 0,5
nasycené mastné kyseliny	g	< 0,1 < 0,1
Sacharidy	g	< 0,5 < 0,5
cukr	g	< 0,5 < 0,5
maltodextrin	g	< 0,5 < 0,5
Bílkoviny (ekvivalent)*	g	75 20
Sůl	g	0,05 < 0,01
Aminokyseliny	g	90 24
L-alanin	g	3,9 1,0
L-arginin	g	3,4 0,92
Kyselina asparagová	g	9,1 2,4
L-cystin	g	2,3 0,61
L-glutamová kyselina	g	10 2,7
L-glutamin	g	4,4 1,2
Glycin	g	2,8 0,74

L-histidin	g	2,3	0,61
L-isoleucin	g	4,7	1,2
L-leucin	g	7,3	2,0
L-lysin	g	7,1	1,9
L-metionin	g	1,6	0,42
L-prolin	g	7,1	1,9
L-serin	g	5,1	1,4
L-treonin	g	4,6	1,2
L-tryptofan	g	1,8	0,48
L-tyrosin	g	7,6	2,0
L-valin	g	5,0	1,3
Minerální látky			
Sodík	mg	20	5,3
Draslík	mg	1347	360
Chloridy	mg	45	12
Vápník	mg	1502	401
Fosfor	mg	1038	277

Hořčík	mg	375	100
Železo	mg	23	6,0
Stopové prvky			
Zinek	mg	19	5,0
Měď	µg	1350	360
Jód	µg	263	70
Chrómov	µg	45	12
Mangan	µg	5250	1402
Molybden	µg	75	20
Selen	µg	60	16
Vitamíny			
Vitamin A (RE)	µg	1501	401
Vitamin D3	µg	7,5	2,0
Vitamin E (α-tokoferol)	mg	23	6,1
Vitamin K1	µg	113	30
Vitamin C	mg	150	40
Vitamin B1	µg	2251	601

Vitamin B2	µg	2251	601
Niacin NE	mg	26	6,9
Vitamin B6	µg	2626	701
Folát (DFE)	µg	1288	344
Kyselina pantotenová	mg	9,4	2,5
Vitamin B12	µg	4,5	1,2
Biotin	µg	56	15
L-karnitin	mg	60	16
Inositol	mg	334	89

* Přepočet:
1 g bílkoviny = 1,2 g aminokyseliny = 17 kJ = 4 kcal
Číslo šarže / Minimální trvanlivost do: viz krabice

Kontakt: IEM Allergy s.r.o., Padovská 696, 109 00 Praha 10, e-mail: info@iemallergy.com, www.iemallergy.com
Vyrobeno pro: Dr. Schär AG, Winklau 9, 39014 Burgstall / Postal, Itálie

Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii.
Potravina pro zvláštní lékařské účely.

